


واکسن آنفلو آنزا، ایمنی یا تضعیف در مقابل کرونا؟



در حالی که به فصل پاییز نزدیک می شویم، برخی از مردم برای ایمنی در مقابل آنفلو آنزا واکسن تزریق می کنند اما امسال با توجه به شیوع کرونا، ابهاماتی در خصوص تزریق این واکسن ایجاد شده که آیا واکسن موجب ایمنی در برابر کرونا می شود یا با تضعیف ایمنی بدن شرایط را برای ابتلا به کووید ۱۹ فراهم می کند؟

به گزارش ایرنا، برخی از مردم بر این باور هستند چون واکسن آنفلو آنزا نسخه ضعیف شده ی ویروس است و موجب تب و تضعیف سیستم ایمنی پس از تزریق می شود پس زمینه را برای ابتلا به کرونا راحت تر کرده و نباید مصرف شود.

برخی نیز بر این باور هستند که تزریق واکسن آنفلو آنزا موجب تقویت سیستم ایمنی می شود و همین امر ابتلا فرد به کووید ۱۹ را سخت تر کرده پس باید استفاده شود.

رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این خصوص به ایرنا گفت: واکسن آنفلو آنزا و کرونا دو مقوله جدا از هم هستند و ارتباطی به یکدیگر ندارند.

حمید مخیری افزود: هشت ساعت نخست پس از تزریق واکسن آنفلو آنزا (در برخی منابع علمی سه ساعت) ویروس زنده ضعیف شده در بدن می چرخد و احتمال ابتلا به سایر ویروسها وجود دارد بنابراین پیشنهاد می شود در این مدت افراد در محل مناسب و خانه بمانند.

وی اظهار داشت: پس از این تزریق، سیستم ایمنی بدن فرد به مدت حدود ۲ ماه تقویت می شود بنابراین پیشنهاد می شود افرادی که هر ساله نیازمند تزریق این واکسن بوده اند امسال نیز مصرف نمایند.

وی تاکید کرد: افرادی که پس از ابتلا به کرونا دوران نقاهت خود را نیز گذرانده اند در صورت تایید پزشک معالج و نداشتن

بیماری های منع مصرف آنفلو آنزا می توانند این واکسن را تزریق کنند.
رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه واکسن آنفلو آنزا اواخر شهریور تا اوایل مهر در داروخانه ها موجود است ادامه داد: این واکسن به صورت دولتی میان بیماران خاص و برخی کادر توزیع می شود و شهروندان می توانند برای خرید آن به داروخانه های استان مراجعه کنند.مخیری در خصوص تزریق واکسن آنفلو آنزا برای کودکان در شرایط شیوع کرونا افزود: واکسن برای کودکان ۶ ماه به بالا تزریق می شود اما مقدار آن برای سنین ۶ ماه تا سه سال نصف میزان مصرفی (دوز) افراد بالغ است.

به گفته وی بهترین پاسخ ایمنی کودکان به واکسن آنفلو آنزا بین سنین ۶ ماه تا هشت سال است.

رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد: واکسن دولتی در سطوح مختلف اولویت بندی از جمله پرسنل بیمارستان شامل بخش های ایزوله، تنفسی جراحی، اورژانس و آزمایشگاه، بیماران خاص همچون مبتلایان

سومین سرطان شایع کودکان

علائم تومور مغزی در بچه ها

اگر چه تومور مغزی کودکان سومین سرطان شایع در بچه ها است، ولی به دلیل عدم آشنایی والدین با علائم این بیماری اغلب زمانی به پزشک مراجعه می کنند که تومور به مرحله پیشرفته رسیده است.

علی محمدی مقدم جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات، در گفتگو با مهر، گفت: تومور مغزی کودکان دلیل مشخصی ندارد ولی زمانی شروع می شود که سلول‌های طبیعی دچار جهش در DNA می‌شوند، این جهش‌ها باعث می‌شوند سلول‌ها با سرعت بالاتری رشد و تقسیم شوند و پس از مدتی به تومور تبدیل می‌شوند.

وی تصریح کرد: علائم به ظاهر غیر مرتبط باعث می‌شود که آخرین مرحله مراجعه خانواده‌ها به متخصص مغز و اعصاب باشد، به عبارت دیگر ابتدا والدین مشکلات فرزند خود را ناشی از سرماخوردگی، گوارش و حتی بینایی و چشم می‌پندارند و همین امر باعث می‌شود که وقتی تومور به حالت تهاجمی می‌رسد متوجه اختلالات موجود در مغز کودک شوند.

محمدی مقدم ادامه داد: لکنت زبان، عدم تعادل، اختلال در بلع، مشکلات حافظه، مشکلات شنوایی، تغییر شخصیت یا رفتار، حرکت غیر طبیعی چشم، سردرگمی، تحریک پذیری، از دست دادن اشتها یا اختلال در تغذیه، ضعف یا از بین رفتن احساس در بازو یا پا تنها بخشی از علائم وجود تومور مغزی کودکان است و خانواده‌ها نباید از این موارد به سادی بگذرند. وی با بیان اینکه وجود لکه روی جمجمه و حتی پوست نوزاد

به ایدز، سیستم ایمنی ضعیف، بیماران پیوندی دیالیزی و تالاسمی و سپس مراکزى مانند سرای سالمندان و نگهداری معلولان توزیع می‌شود.
مخیری تاکید کرد: برخی افراد نیز که حساسیت شدید یا منع مصرف واکسن دارند باید با حضور در اورژانس بیمارستانی و با نظر پزشک نسبت به تزریق آن اقدام نمایند.

آنفلو آنزا یا گریپ (Grippe) شایعترین بیماری ویروسی فصل سرما است که دستگاه تنفسی را درگیر می کند و شدیداً مسری است که مدت زمان شروع علائم آن از زمان وارد شدن ویروس به بدن ۴۸-۲۴ ساعت است.

ویروس های آنفلوآنزا موجود در قطرات تنفسی از طریق سرفه و عطسه منتشر می شوند در اغلب موارد این انتشار از فرد به فرد و معمولاً از طریق تماس دست با آنچه که به ویروس آنفلوآنزا آلوده شده و سپس تماس دست آلوده با دهان و بینی فرد منتقل می شود.

بزرگسالان ممکن است دیگران را روز قبل از شروع علائم تا روز پس از بروز بیماری مبتلا نمایند که این امر به این معنی است که می توانند فردی را قبل از آنکه بیماری در آنها ایجاد شده باشد مبتلا نمایند.

علائم شایع بیماری آنفلوآنزا شامل بالا بودن درجه حرارت بدن، ابتلا به درد ناگهانی یا ترشح از یک یا دو گوش، احساس درد در گوش خود و ادامه آن به مدت بیش از چند روز، آبریزش و گرفتگی بینی بیش از ۱۰ روز، سرفه همراه با خلط غلیظ و بدبوی زرد و سبز رنگ، گلودرد بیش از ۴۸ ساعت به هنگام بلع غذا، حساسیت های پوستی یا جلدی غیر قابل توجیه، سفتی گردن همراه با سردرد مداوم، درد در ناحیه سینوزیت ها، تب و لرز، دردهای عضلانی از جمله کمردرد و خستگی است. البته این موارد با برخی از آنها می توانند به تنهایی بیانگر ابتلا به آنفلوآنزا یا سایر بیماری های ویروسی باشد بنابراین تشخیص قطعی با مراجعه به پزشک حاصل می شود.



وی با بیان اینکه به اندازه سر کودک تا قبل از دوسالگی باید توجه داشت، افزود: به دلیل باز بودن درزهای جمجمه اطفال تا ۱۹ ماهگی ممکن است تومورهای مغزی از داخل به جمجمه فشار وارد کند و همین امر باعث رشد غیرعادی سر شود.محمدی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های تومور مغزی در کودکان انحراف پیدا کردن چشم‌ها است، این انحراف اگر به دلیل بالا رفتن فشار داخل جمجمه باشد معمولاً به سمت پایین است اما فالج عصب‌های چشمی به دلیل ضایعه مغزی ممکن است به انحراف چشم‌ها به هر سمت منجر شود به همین دلیل این اتفاق باید مهم و جدی در نظر گرفته شود، درحراهل آنچه مسلم است والدین باید حداقل تغییرات رفتاری و جسمی کودک را با حساسیت دنبال کنند تا در صورت وجود تومور مغزی بتوان آن را در همان مراحل ابتدایی درمان کرد.

خوراکی پرطرفداری که خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد

مصرف بستنی دویینگ کرده و انرژی خود را دوباره به دست بیاورید.

کاهش خطر ابتلا به سرطان

برای جلوگیری از ابتلا به هر نوع سرطان استفاده از لبنیات و فرآورده‌های شیر توصیه می‌شود. حال با توجه به اینکه در بین فرآورده‌های شیر، بستنی یکی از پرطرفدارترین آن‌هاست جایگزین مناسبی برای دریافت کلسیم و پروتئین است و به همین خاطر مصرف میزان معین و مشخصی از بستنی برای همه افراد توصیه می‌شود.

عملکرد بهتر و هوشیاری مغز

مصرف شیر در ابتدای روز برای صبحانه نیز توصیه می‌شود که می‌توان مصرف بستنی را در طول روز جایگزین این نوشیدنی کرد تا در طول روز از هوشیاری بیشتری برخوردار باشید.

تقویت سیستم ایمنی بدن

بستنی سرشار از مواد معدنی، ویتامین‌ها، پروتئین و همچنین کلسیم است که با مصرف تنها یک بستنی می‌توانید همه این ویتامین‌ها و مواد معدنی را به صورت یکجا دریافت کنید. همچنین مصرف بستنی سبب می‌شود تا بدن شما در برابر حمله و هجوم انواع ویروس‌ها و باکتری‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان داده و در نهایت باعث بهبود و عملکرد سیستم گوارشی و تنفسی شما نیز شود.

قدن آن نه تنها برای جنین خطر ساز نیست بلکه به فرآیند رشد ه‌رچه بهتر جنین نیز کمک می‌کند. همچنین استفاده از بستنی می‌تواند یکی از راه‌های افزایش احتمال بارداری در بین بانوان شود.

افزایش شادی و انرژی

بستنی دارای کالری بسیار زیادی است پس اگر بر اثر فعالیت زیاد در طول روز میزان قابل توجهی از انرژی خود را از دست داده اید و احساس خستگی و کسالت می‌کنید می‌توانید با

بستنی یکی از خوراکی‌های پرطرفدار بین همه گروه‌های سنی است که علاوه بر فواید زیاد، خطر ابتلا به سرطان را هم کاهش می‌دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بستنی یکی از خوراکی‌های پرطرفدار فصل داغ تابستان است که علاوه بر کودکان، بزرگسالان نیز علاقه بسیار زیادی به مصرف این خوراکی خوشمزه دارند و البته فواید بسیار فراوانی هم دارد.

تقویت استخوان‌ها

شیر از جمله نوشیدنی‌هایی است که به دلیل پروتئین و کلسیم فراوان برای جلوگیری از پوکی استخوان و رشد و استحکام استخوان‌ها و تقویت دندان مفید و سودمند است. بستنی یکی از فرآورده‌های شیرین است که برای تولید آن به میزان قابل توجهی شیر نیاز است.

کسانی که تمایل به مصرف شیر ندارند بستنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن‌ها باشد، اما باید توجه داشت که نباید در مصرف آن زیاده‌روی کرد. زیرا شکر و افزودنی‌های شیرین موجود در بستنی زمانی که بیش از حد مصرف شود می‌تواند دردرساز باشد.

کمک به رشد جنین و باروری

جنین برای رشد کامل‌تر خود نیاز به دریافت مواد معدنی و پروتئینی و کلسیم دارد که آن را از طریق بدن مادر دریافت می‌کند. پس مصرف بستنی در دوران بارداری با در نظر گرفتن

۱) مقابله با آلرژی را زودتر از موعد شروع کنید

بسیاری از عوامل آلرژیک از اواسط تا اواخر ماه اوت (اواخر مرداد و اوایل شهریور) ظاهر می‌شوند. مصرف داروهای آلرژی خود را حدود دو هفته قبل از زمان معمول شروع علائم خود شروع کنید. مقابله با علائم به معنای کنترل بهتر آن‌هاست، داروهای خود را تا حدود دو هفته پس از این که میزان گرده‌ها کاهش یابد، قطع نکنید.

۲) با کپک‌ها مقابله کنید

حساسیت به کپک به سختی قابل پیشگیری است. کپک می‌تواند در هر جایی که آب وجود داشته باشد، رشد کند و یک عامل آلرژی رایج در پاییز است. کپک را می‌توانید در زیرزمین، حمام، یک کابینت دارای نشی در زیر سینک ظرفشویی یا در انبوهی از برگ‌های مرده در حیاط خانه پیدا کنید. کلید کاهش کپک کنترل رطوبت است. حتماً از هواکش برای حمام استفاده کنید و بلافاصله آب را کد کف را تمیز کنید. هر کپک قابل رویت در سطوح را با مواد شوینده و آب بشویید و کاملاً خشک کنید. همچنین می‌توانید با نگه داشتن رطوبت در منزل زیر ۶۰ درصد و تمیز کردن منظم ناوان‌ها با دفع کپک کمک کنید.

۳) گرده‌ها را دور نگه دارید

علف‌ها، گیاهان کهنه‌واش یا هر گرده‌ای که علائم آلرژی شما را ایجاد می‌کند، باید از محیط خانه دور بماند. کشش‌های خود را درب منزل بگذارید و بعد از کار یا بازی در

شیلد محافظ را جایگزین ماسک

صورت نکنید!



شیلدهای پلاستیکی محافظ صورت، می‌توانند سپری در برابر انتقال ویروس کرونا باشند اما جایگزین مناسبی به جای ماسک نیستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان می‌گویند اگرچه شیلدهای پلاستیکی محافظ صورت می‌توانند سپری در برابر انتقال ویروس کرونا باشند، اما این خاصیت شیلدها فقط زمانی است که به همراه ماسک استفاده شوند و نه به جای آن.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده تاکید می‌کند که ماسک‌های صورت اصلی‌ترین روش برای محافظت از خود و دیگران در برابر ویروس کرونا هستند.

با این حال، شیلدهای پلاستیکی صورت در میان برخی افراد به دلیل عدم تحمل گرما و تنفس محدود، بسیار محبوبیت پیدا کرده‌اند. هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه آیا شیلدهای صورت به تنهایی می‌توانند به جلوگیری از شیوع ویروس کمک کنند، وجود ندارد. با این حال، استفاده از این شیلدها به همراه استفاده از ماسک شستن منظم دست‌ها و رعایت فاصله اجتماعی ابزار بسیار مناسبی برای کنترل انتقال ویروس است.

پلاستیکی صورت، رعایت چند نکته ضروری است:

- همیشه به همراه شیلدهای پلاستیکی ماسک بزنید.
با این کار احتمال انتقال ویروس را بسیار کمتر از زمانی می‌کنید که هر کدام از این دو ابزار را به تنهایی استفاده کنید.

- اطمینان حاصل کنید که این شیلدها در جای مناسبی روی صورت قرار گرفته است. شیلد باید به سطح چانه یا زیر آن برسد.

- شیلدها باید فاصله بین دو گوش را به طور کامل پوشش داده و نباید بین پیشانی و جلوی این محافظ‌ها شکاف وجود داشته باشد. در غیر این صورت قطرات تنفسی می‌تواند از شکاف وارد شده و روی صورت بیفتد.
- پس از هر بار استفاده از شیلد، صورت خود را تمیز و ضد عفونی کنید.

- به کمک مواد شوینده و آب گرم، شیلد را ضد عفونی کنید. شیلدها بهتر است ترجیحاً با محلول‌های حاوی کلر ضدعفونی شوند.
اکل می‌تواند به مرور زمان به پلاستیک و چسب آن‌ها آسیب برساند.

- بعد از شستشوی شیلد، با حوله‌های کاغذی تمیز رطوبت آن‌ها را از بین ببرید.

یک متخصص تغذیه عنوان کرد:

افزایش خطر ناباروری

در مردان چاق

عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: به ازای هر ۹ کیلوگرم اضافه وزن، ۱۰ درصد خطر ابتلا به ناباروری در مردان افزایش می‌یابد.

به گزارش مهر، غزاله اسلامیان، در خصوص ناباروری در مردان گفت‌ار اضافه وزن و چاقی، اظهار داشت: کیفیت اسبرم‌ها به ویژه تعداد کل اسبرم‌ها و تعداد اسبرم‌های متحرک در مردان چاق در مقایسه با مردان دارای وزن مناسب، پایین‌تر است. این افت کیفیت اسبرم‌ها و اختلالات در ترشح هورمون‌های جنسی در مردان چاقی که مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت هستند بیشتر است.

وی افزود: مردان چاقی که برای کاهش وزن از رژیم‌های غیراصولی پیروی می‌کنند، در نتیجه گرسنگی سلولی به سرافشان می‌آید و بنابراین اسبرم‌ها نیز این گرسنگی را تجربه خواهند کرد و کاهش کیفیت اسبرم‌ها هم به دلیل اضافه وزن و هم به دلیل کاهش وزن غیر اصولی دوچندان می‌شود.

عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: بنابراین مردان چاق با مراجعه به متخصصین تغذیه، پس از ارزیابی وضعیت تغذیه با دریافت یک رژیم غذایی کاهش وزن متعادل متنوع و متناسب با نیازهایشان و همچنین اصلاح عادت‌های غلط غذایی، می‌توانند نقش مهمی سلامت فرزند آینده خود داشته باشند. در صورتی که به دلیل شرایط سنی پدر و مادر، زمان کافی برای کاهش وزن و رسیدن به وزن مناسب وجود ندارد، توصیه می‌شود از حدود سه ماه قبل از اقدام به فرزند آوری ابتدا ۵ تا ۱۰ درصد وزن فعلی را کاهش داده و سپس اقدام کنند.وی اظهارداشت: نصف بشقاب غذای مصرفی در هر وعده غذایی باید متشکل از سبزی‌های تازه باشد، یک چهارم آن، از انواع پروتئینی (ترجیحاً گوشت‌های سفید مانند مرغ و ماهی و یا جایگزین‌های گیاهی آن مانند حبوبات) و یک چهارم باقی‌مانده از انواع غلات کامل (سبوس‌دار) تشکیل شده است.

نکات مفید برای کنترل آلرژی در پاییز

نزدیک شدن پاییز برای بسیاری از افراد به معنی فرا رسیدن فصل آلرژی

خس خس سینه، آبریزش بینی و خارش و سوزش چشم است؛ علائمی که گاه می‌توانند خسته کننده و طاقت فرسا شوند.

به گزارش ایسنا، اگر به نظر می‌رسد علائم آلرژی شما هر ساله زودتر و زودتر از موعد بروز می‌کند، اشتباه نمی‌کنید. تغییرات آب و هوایی ممکن است در واقع باعث ایجاد فصل آلرژی زودتر و طولانی‌تر از سال‌های گذشته شود.

علاوه بر این ورزش بیشتر و شدیدتر باز نیز می‌تواند به معنای افزایش علائم آلرژی باشد، زیرا باد می‌تواند گرده را از گیاهان، علف‌ها و درختان تا بیش از ۱۶۰ کیلومتری

منبع خود حمل کند.

گرده گیاهان کهنه‌واش بزرگ‌ترین محرک آلرژی در پاییز است و باید در کنار سایر محرک‌های آلرژیک مانند کپک و گرده چمن از آن اجتناب شود.

در ادامه پنج نکته از پایگاه اطلاع‌رسانی کالج آلرژی، آسم و ایمونولوژی آمریکا (ACAAI) آورده شده است تا به شما کمک کند از بدترین دشمنان آلرژی خود دوری کنید:

نورخیزستان آنلاین: www.NoorDaily.ir

روابط عمومی: NoorDaily@yahoo.com

واکسن کرونای مبتنی بر سلول

حشره به انسان‌ها تزریق شد



نخستین واکسن پروتئین نوترکیب کووید ۱۹ چین که از سلول‌های حشره ساخته شده، اخیراً به افراد داوطلب تزریق شده است.

به گزارش فارس به نقل از گلوبال تایمز، نخستین واکسن پروتئین نوترکیب کووید ۱۹ چین که از سلول‌های حشره ساخته شده، اخیراً به افراد داوطلب تزریق شده است.

براساس اطلاعات موجود، داوطلبان پس از تزریق واکسن هیچ عوارض شدیدی را گزارش نکردند.

این واکسن توسط آزمایشگاه of West China Key State of Biology و وابسته به دانشگاه Therapy of Biological Hospital of Hospital

این واکسن از سلول حشرات برای تکثیر محیط کشت استفاده و زن کووید ۱۹ را وارد سلول های حشره می کند؛ در واقع می توان از سلول های حشرات برای تولید پروتئین های با کیفیت واکسن نوترکیب استفاده کرد.

طبق بیانیه ارسال شده به گلوبال تایمز، این واکسن صبح روز شنبه به چند داوطلب تزریق شد؛ آکادمیکس وی یو کوکان، مدیر آزمایشگاه گفت: این واکسن پس از آزمایش روی میمون‌ها و سایر حیوانات، از ۲۱ آگوست برای آزمایشات بالینی مورد تأیید سازمان ملی پزشکی قرار گرفت و درنهایت مشخص شد که این یک اثر محافظتی خوب در برابر عفونت COVID-۱۹، بدون عوارض جانبی شدید است.

طبق گفته مدیر آزمایشگاه، تولید انبوه واکسن مذکور آسان است؛ تاکنون چهار نوع واکسن کرونا ویروس در چین مرحله سوم آزمایشات بالینی را آغاز کرده‌اند و برخی از آنها در اوایل ماه سپتامبر به افراد داوطلب تزریق می‌شوند.

آزمایشات بالینی فاز III تعیین می‌کند که آیا واکسن توسعه داده شده تأیید می‌شود یا خیر؛ این مرحله ایمنی و اثر بخشی واکسن را که به ده‌ها هزار نمونه احتیاج دارد، تأیید می‌کند.

شکست یک داروی دیگر

در درمان کرونا

شرکت داروسازی سانوفی اعلام کرد آزمایش داروی کیوزارا برای درمان ویروس کرونا موفقیت آمیز نبوده است.

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، شرکت داروسازی سانوفی اعلام کرد آزمایش داروی کیوزارا برای درمان ویروس کرونا موفقیت آمیز نبوده است.

این دارو برای درمان روماتوئید آرتروز یا روماتیسم مفصلی به کار می‌رود و تصور می‌شد، می‌تواند در بهبود حال بیماران مبتلا به کووید ۱۹ نقش داشته باشد.

در همین راستا، شرکت داروسازی سانوفی آزمایشات بالینی داروی Kevzara خود را برای استفاده علیه ویروس کرونا متوقف می‌کند.

آزمایشات بالینی اخیر این دارو که به صورت بین‌المللی اجرا شده، در برخی از بیماران واکنش‌های جانبی ایجاد کرده است؛ مصرف این دارو برای بیماران مبتلا به کرونا تبعاتی همچون ذات الریه و حتی در برخی از موارد منجر به مرگ بیمار را در پی داشته است.

سانوفی یکی از چندین شرکتی است که در حال حاضر اقدام به تولید واکسن علیه کووید ۱۹ کرده است؛ این شرکت Kevzara را با شریک آمریکایی خود، Regeneron به منظور درمان روماتوئید آرتروز یا روماتیسم مفصلی تولید می‌کند. گروه داروسازی شرکت سانوفی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این آزمایش بین‌المللی که بر روی ۴۲۰ بیمار انجام گرفت نتوانست معیارهای ارزیابی اصلی و فرعی را در بهبود حال مبتلایان به کرونا به دست آورد.

موسسه ملی سلامت در آمریکا:

پلاسما درمانی روشی استاندارد

برای مهار کووید-۱۹ نیست

کارشناسان موسسه ملی سلامت در آمریکا اعلام کردند، استفاده از پلاسمای بهبودیافتگان کووید-۱۹ نباید به عنوان روش درمانی استاندارد برای معالجه این بیماری در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام موسسه ملی سلامت در آمریکا شواهدی در حمایت از تاثیر مثبت پلاسمای بهبودیافتگان کووید-۱۹ در درمان افراد آلوده به کروناویروس وجود ندارد و پزشکان نباید این روش را به عنوان روش درمانی استاندارد برای این بیماری در نظر بگیرند مگر اینکه مطالعات و آزمایشات بیشتر و دقیق‌تر در این خصوص انجام شود.

کارشناسان این موسسه اظهار داشتند: اطلاعات کافی در تایید یا رد تاثیر پلاسمای بهبودیافتگان کووید-۱۹ در درمان بیماران وجود ندارد. در نتیجه پلاسما درمانی نباید به عنوان روش استاندارد برای درمان بیماران آلوده به کروناویروس معرفی شود.

به گفته این کارشناسان ضرورت دارد تا آزمایشات جامع، کنترل شده و منسجم انجام شود و مشخص گردد آیا پلاسمای بهبودیافتگان کووید-۱۹ روش درمانی موثر و ایمن برای مقابله با این بیماری است؟ به گزارش شبکه خبری سی ان ان، هفته گذشته سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از پلاسمای بهبودیافتگان کووید-۱۹ را برای شرایط اضطراری تایید کرده است.